



اگر کودکان سابقه حساسیت به بتادین یا داروهای بی حس کننده دارد حتماً به پزشک یا پرستار بگویید.

در طی آزمایش چه می‌شود؟

کودک شما مانند شکل زیر روی میز معاینه خوابانده می‌شود. کودکان کمی گریه خواهد کرد و طبیعی است زیرا افراد غریبه دور کودک را گرفته‌اند و پرستار نیز او را بی حرکت نگه می‌دارد.

شنیدن گریه کودک ممکن است شما را آشفته کند، اما نگران نشوید. پزشک پس از ضد عفونی کردن قسمت پایین کمر کودک، محل ورود سوزن را بی‌حس می‌کند تا کودک شما تا جای ممکن احساس درد نکند. سپس با دقت با استفاده از سوزن نازکی مقداری از آب نخاع کودک را می‌کشد و پس از آن یک پانسمان کوچک را روی محل قرار می‌دهد.

بعد از انجام آزمایش چه باید بکنید؟

پزشک کودکان ممکن است توصیه کند بین ۳۰ دقیقه تا چند ساعت کودک شما به پشت بخوابد. از چند ساعت بعد از نمونه‌گیری، ممکن است کودکان سر درد خفیفی داشته باشند که هنگام نشستن یا ایستادن بدتر می‌شود. طی ۲۴ ساعت اول از وی بخواهید استراحت کند و مایعات فراوان به او بدهید. شیر و آب بهترین مایعات هستند. تا ۴۸ ساعت از کودک بخواهید فعالیت سخت انجام ندهد. این کارها احتمال بروز سر درد را کم خواهد کرد. اگر سر درد کودک شدید است و با استراحت کردن بهتر نمی‌شود به پزشک اطلاع دهید. دادن استامینوفن نیز می‌تواند درد را تسکین دهد. از پزشکستان بپرسید آیا می‌توانید به وی استامینوفن بدهید. اگر مشکلی نبود یکی دو روز بعد از انجام LP کودک می‌توانید کودک را حمام کنید.

دسترسی به آموزش بیمار از آدرس اینترنتی:

bahrami.tums.ac.ir

* تهران، خیابان دماوند، خیابان شهید کیایی، خیابان انصارالحسین

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی، تلفن: ۷۳۰۱۳۰۰۰

* نوبت دهی تلفنی ۷۷۵۸۶۳۸۵ - ۷۷۵۸۶۳۸۹ - ۷۷۵۸۶۳۹۴

۷۷۵۸۶۴۰۲ (به صورت ۲۴ ساعته)

* نوبت دهی اینترنتی: nobat.tums.ac.ir

نمونه برداری از مایع مغزی، نخاعی (LP)

کد: ۱-۱۸

نمونه برداری از مایع مغزی، نخاعی چیست؟

بیشتر مردم تصور می‌کنند نمونه‌گیری از مایع مغزی، نخاعی ضرر دارد و ممکن است سبب آسیب به نخاع کودک و احیاناً فلج شود. این تصور اشتباه است زیرا جایی که سوزن وارد ستون فقرات کودک می‌شود جایی است که در آنجا نخاع وجود ندارد. نمونه‌گیری از مایع نخاع یک آزمایش تشخیصی ایمن است و در اکثریت موارد هیچ عارضه‌ای بدنال ندارد.

هدف از انجام مایع مغزی، نخاعی (LP) چیست؟

نمونه برداری از مایع مغزی، نخاعی که در پزشکی به آن (LP - ال پی) می‌گویند به پزشک کمک می‌کند تا پی به وجود بیماری‌های مهمی از جمله عفونت پرده‌های مغز و بافت مغز ببرد.

چگونه کودکان را برای این آزمایش آماده کنید؟

به فرزندتان بگویید گر چه ورود سوزن کمی ناراحت کننده است اما دردناک نیست و زیاد طول نمی‌کشد.

به فرزندتان تاکید کنید که در مدت انجام آزمایش کاملاً بی حرکت باشد. به وی بگویید که ممکن است یک پرستار او را خم کند و محکم بگیرد. نترسد، آنها نمی‌خواهند به وی آسیب بزنند. این کار برای این است که مهره‌های ستون فقرات وی از هم بازتر شود و پزشک راحت‌تر و سریعتر بتواند نمونه آب نخاع را بکشد و کار سریعتر تمام شود.

